


Fajnév:	Habichtskauz (<i>Strix uralensis</i>)
A név eredete:	Erőteljes keresztirányú csíkozottság a farkon és a szárnyakon, amely a fiatal héjáéhoz (lásd németül: <i>Habicht</i>) hasonló
Ismertetőjelek:	<p>Általános jellemzők</p> <ul style="list-style-type: none"> • viszonylag kicsi, feketésbarna szemek • szarusárga csőr és afölött felfutó sötét középcsík • egyértelműen kivehető, világos arcrajzolat a szélén finom, sötét sugár formájú radiális csíkozottsággal • hosszú, ék alakúan lekerekített farkok • mellkasi tollazat vastag, sötét hosszanti csíkozottságú (keresztirajzolat nélkül! → lásd macskabagoly) <p>Vigyázat! Könnyen összetéveszthetők! Uráli bagoly (bal) & Macskabagoly (jobb)</p> 
Méret:	55 - 60 cm
Szárnyfesztáv.	Hím: 115 cm Nőstény: 125 cm
Tömeg:	Hím: 540 - 730 g Nőstény: 720 - 1200 g
Előfordulás:	Észak-Európa: Skandinávia, Baltikum Dél-Kelet-Európa: Olaszország, Szlovénia, Magyarország, valamint Kárpátok Sikeres visszatelepítés Németországban és Csehországban; Ausztria: Jelenleg csak szórványos előfordulás



Élőhely:	Nyílt, idős faállományok (lombos fák: bükk, tölgy stb.), ahol a kisemlősök előfordulása magas, valamint erdős tájak mozaikosan elszórt, extenzíven használt gyepekkel
Életmód:	Szürkületben, illetve éjszaka aktív (a fiókák nevelése alatt, illetve télen nappal is)
Vadászstratégia:	Vártavadász; Zsákmányának helyzetét a legtöbb esetben hallás alapján lokalizálja, majd a föld közvetlen közelében siklik a prédájáig. (Az uráli bagoly akár 20-30 cm hóréteg alatt is megtalálja áldozatát!)
Préda:	Kisemlősök: első sorban pockok és erdei egerek, pelék. Ritkábban madarak, kétéltűek és rovarok
Hangaktivitás:	A nász alatt szürkületkor kb. 2 órán keresztül, illetve kora reggel napkelte előtt
Párválasztás:	Monogám = Tartós párválasztás
Költőhely:	Faodvakban, kikorhadt fatönkökön és részben fészkekben. Szívesen beköltözik fészkekodúba is
Tojási időszak:	A tojásrakás márciusban, áprilisban történik 2-3 (max. 6) tojással
Költési időtartam:	27 - 29 nap A nőstény megvédi a költőhelyet, illetve a költőhelyen a fiókákat
Fiókaállapot	34 - 35 nap, ez idő alatt a táplálékszerzésről kizárólag a hím gondoskodik. A fészek elhagyása után a fiatal egyedeket még további két hónapig a szülők etetik.
Nemi érettség:	Az első életév végétől (~ 10 hónap)
Vadászterület nagysága:	~3-5 km ² (300 - 500 futballpálya, vagy 2x2 km)
Élethossz:	Fogságban max. 25 év
Veszélyek:	<ul style="list-style-type: none"> • Közúti forgalom (repülés vadászatkor közvetlen a talaj felett!) • Elektromos vezetékek és kerítések (az ütközések röpképtelenséget okozhatnak)

	<ul style="list-style-type: none">• Illegális kilövés (Az uráli baglyok bizalmasan viselkednek, és csak akkor menekülnek el, amikor a megfigyelő már csak néhány méterre található tőlük)
Védelem:	Az uráli bagoly Ausztriában és egész Európában szigorú védelem alatt áll. Ausztriában a Vadásztörvény és a Természetvédelmi Törvény egész évben védettnek tekinti. Az Európai Unió Madárvédelmi Irányelve az I. számú függelékben említi, azaz speciális intézkedések szükségesek a faj védelméhez.